

إعطاء كليكسان في المنزل

دليل للمريض وأفراد العائلة

علاج آمن • وقاية • ثقة • استمرارية في التعافي



ما هو كليكسان؟

i

كليكسان دواء مميّع للدم يساعد في الوقاية من تكوّن الجلطات الدموية. يُستخدم العلاج عادة في الحالات التالية:




بعد جراحة
أو أثناء الإقامة
في المستشفى



قلة الحركة
أو الشلل
الجزئي



بعد العمليات
الجراحية



بعد السكتة
الدماغية


مهم: يجب الاستمرار بالعلاج تماماً حسب تعليمات الطبيب عند الخروج من المستشفى.

كيف يتم الحقن؟

3



1. أمسك طية من الجلد بلطف.



2. أدخل الإبرة بزاوية 90° درجة.



3. الحقن الدواء ببطء وبشكل ثابت.



4. انتظر لعدة ثوانٍ قبل سحب الإبرة.



5. أخرج الإبرة ثم اترك طية الجلد.


لا تدلك مكان الحقن بعد الانتهاء من الحقن.

أين يتم الحقن؟

2

يُعطى الحقن في طبقة الدهون تحت الجلد في:

منطقتي البطن اليمنى واليسرى.



يجب الانتباه إلى:

- ✓ الابتعاد مسافة لا تقل عن 5 سم عن السرة.
- ✓ تغيير مكان الحقن في كل مرة.
- ✓ تجنب المناطق التي يوجد فيها كدمات أو احمرار أو جروح.

التحضير قبل الحقن

1



- ✓ اغسل يديك جيداً بالماء والصابون.
- ✓ تأكد من أن الجرعة والمحقنة صحيحتان.
- ✓ تحقق من تاريخ الصلاحية.
- ✓ اختر مكاناً نظيفاً ومضاء ومريحاً.
- ✓ جهز حاوية آمنة للتخلص من الإبرة.
- ✓ أخرج المحقنة من التلاجة قبل الحقن بوقت قصير.



نصائح مهمة للنجاح

6

- ✓ اعط الحقن كل يوم في نفس الوقت.
- ✓ غير مكان الحقن كل مرة.
- ✓ احفظ الدواء حسب تعليمات الشركة المصنعة.
- ✓ في حال نسيان الجرعة - اتبع تعليمات الفريق الطبي.
- ✓ عند وجود أي استفسار - تواصل مع الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي.



متى يجب مراجعة الطبيب؟

5

- تواصل فوراً مع الطبيب أو توجه إلى الطوارئ؛ عند:
- نزيف لا يتوقف.
- وجود دم في البول أو البراز.
- كدمات كبيرة أو غير معتادة.
- ألم شديد أو تورم واضح.
- ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.
- صداع شديد أو دوخة مفاجئة.
- رد فعل تحسسي مثل طفح جلدي أو حكة.

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك دون استشارة الطبيب.

بعد الحقن

4

- ✓ تخلص من المحقنة في الحاوية المخصصة لذلك.
- ✓ لا تُعد استخدام المحقنة مرة أخرى.
- ✓ قد يظهر كدمة صغيرة أو ألم موضعي - وهذا أمر طبيعي.
- ✓ استمر في العلاج حسب تعليمات الفريق الطبي.



نصائح لتقليل الألم والكدمات

- حقن في طبقة الدهون فقط.
- لا تحقن في مناطق حساسة أو بها كدمات.
- اضغط برفق على المكان بعد الحقن باستخدام شاش جاف.



التخلص من المحاقن والإبر

- ضع المحاقن والإبر في حاوية آمنة للتخلص من الأشياء الحادة.
- أغلق الحاوية عند امتلائها.
- اتبع تعليمات الطاقم الطبي.
- أو البلدية للتخلص منها.



لديك سؤال؟ نحن هنا من أجلك

لاي سؤال أو استفسار - لا تتردد في التواصل مع فريق العلاج.



نتمنى لك الشفاء العاجل



استمر على علاج كليكسان للوقاية من الجلطات الدموية ولضمان استمرارية التعافي في المنزل بأمان.

GASHER | NeuroBridge

مركز التوجيه الرقمي للمرضى وأفراد العائلة
دائرة التأهيل العصبي

المعلومات في هذا الملصق للتوعية فقط ولا تغني عن استشارة الطبيب. في كل حالة شك أو أعراض غير طبيعية - تواصل فوراً مع الطبيب أو توجه إلى الطوارئ.